

PARASITOLOGICO COMPLETO TRES MUESTRAS (PA004)

UTILIDAD CLINICA

Este examen es para ser utilizado con especímenes fecales de pacientes con diarrea u otras molestias abdominales, para determinar la presencia de parásitos intestinales que pueden ser detecta-

dos tanto por técnicas simples de microscopía como por métodos especiales de concentración y tinción.

DESCRIPCION

Detección e identificación integral de parásitos intestinales mediante varias técnicas de concentración, tinción y microscopía, en tres muestras de heces fresca o preservada. Incluye identificación de protozoarios, huevos de helmintos, larvas de nemátodos o proglótidos de Tenia.

Emplea sedimentación espontánea y tinción con solución de Lugol. Incluye tinción de Kinyoun para oquistes de coccidias y la técnica de Baermann para concentración y extracción de larvas de nemátodos. No incluye tinción para Microsporidia.

INFORMACION CLINICA

EN REVISION

MUESTRA

Heces frescas, refrigeradas o preservadas en formol-acetato, en recipiente apropiado (frasco limpio, seco, de boca ancha y tapa hermética). Mínimo 5 mL (5 g) - Mayor cantidad si conjuntamente se solicitan otros exámenes.

INSTRUCCIONES PARA OBTENCION Y TRANSPORTE DE LA MUESTRA

Obtener la muestra en frasco limpio de boca ancha y tapa hermética. No mezclar la muestra con orina, cremas o talco. Colectar la mayor cantidad posible. En niños pequeños colocar el pañal al revés (por la parte no absorbente), cubrir la salida de la uretra con un trozo de algodón (para no contaminar la muestra con orina) y trasvasar la muestra al frasco. Muestras en pañal no son aceptables. Enviar la muestra al laboratorio inmediatamente después de su obtención en caja térmica con refrigerantes. Muestras de lugares

fuera de Lima o que no pueden enviarse al laboratorio antes de 3 horas desde su obtención deben ser colocadas en recipiente con 10 mL de formol-acetato al 10% hasta su envío. Muestras en un medio de preservación como Cary-Blair no son aceptables para esta prueba. No colectar la muestra en recipientes que contengan formol o compuestos similares, sueros animales, iones metálicos, agentes oxidantes o detergentes debido a posibles interferencias con la prueba.

METODO DE ANALISIS

Microscopía en fresco con salino, concentración por sedimentación espontánea y tinción con solución de Lugol y Kinyoun. Método de Baermann para larvas de nemátodos.

RANGO DE RESULTADOS

Positivo o negativo

RANGO NORMAL

Negativo, no hay parásitos patógenos

TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS

12 - 24 horas desde recibida la tercera muestra

Este examen detecta la mayor parte de parásitos intestinales.

Para un resultado óptimo con *Giardia*, *Cryptosporidium* y *E. histolytica* solicitar el examen de antígeno fecal con ELISA.

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Un resultado POSITIVO indica la presencia del parásito pero no necesariamente que éste sea la causa de los síntomas. Algunos protozoarios y helmintos no son patógenos o causan muy pocas molestias. Si el resultado se informa NEGATIVO en las tres muestras es poco probable que algún parásito esté realmente en el intestino. Este examen no descarta Microsporidia y Oxiuros. Para detectar estos parásitos se debe solicitar el

examen con tinción especial (PA009) o la prueba de Graham (PA005). Para un resultado óptimo con *Cryptosporidium*, *Giardia* o *E. histolytica* se debe solicitar el examen de antígeno fecal en formato ELISA (PA015, PA010 y PA013). Esta información es sólo para ser tomada en cuenta. El médico es el más indicado para decidir lo que se deba hacer en base a los síntomas, el cuadro clínico y el resultado de esta prueba.

LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

1. El examen detecta el parásito entero o los productos de su ciclo reproductivo como huevos y larvas que por ser organismos vivos son vulnerables a las condiciones del ambiente; es importante por ello que la muestra sea obtenida y transportada al laboratorio bajo las mejores condiciones posibles;
2. Si el paciente se ha sometido recientemente a estudios con bario, toma regularmente anti-ácidos, aceite mineral u otros laxantes minerales, o ha tomado recientemente (dentro de las 72 horas previas) antidiarreicos o antibióticos orales, este examen debe pedirse unos días después de suspender esta medicación;
3. Como es un método de observación con microscopio, la precisión y reproducibilidad de esta prueba dependen casi enteramente de la experiencia de quien lo hace.

PORQUE DEBO HACER ESTA PRUEBA EN GASTROLAB?

1. Hemos comparado el valor diagnóstico parasitológico de varios métodos de concentración y tinción y hemos elegido el mejor - es el más caro, pero es el mejor;
2. Cada muestra es examinada dos veces (por dos parasitólogos distintos) antes de entregar el resultado;
3. Tenemos una enorme experiencia haciendo exámenes parasitológicos: más de 2000 exámenes por año;
4. Ofrecemos abundante información para ayudar a elegir el mejor examen, para obtener una muestra adecuada y para interpretar los resultados.

HORARIO DE RECEPCION DE MUESTRAS

Lunes a Viernes de 7:30 AM a 8:30 PM

Sábados de 7:30 AM a 6:30 PM

Atención fuera de horario, llamar al 990-371-374

**PREGUNTE POR NUESTRO SERVICIO DE RECOJO DE MUESTRAS A DOMICILIO
ACEPTAMOS MUESTRAS DE OTROS LABORATORIOS Y DE PROVINCIAS**